AN: 1995, Girdling, Paclobutrazol

TI: Efecto del anillado y de la doble incision anular sobre la floracion de paltos (*Persea americana* Mill.) rebajados, cv. Hass. Efecto del anillado, doble incision y paclobutrazol sobre la cuaja de paltos rebajados (*Persea americana* Mill.) Hass

AU: Wilhelmy G, Carlos Alejandro

AC: Universidad Catolica de Valparaiso. Fac. de Agronomia

PI: Quillota, 1995, 146 p.

NO: Tesis (Ing Agr) 86 ref. Sumario (Es)

DE: palta; variedades; anilladura; reguladores-de-crecimiento; paclobutrazol; floracion; fructificacion; rendimiento

CC: F01 F62 F63 0600

ABSTRACT IN SPANISH

AB: Para intentar aumentar la produccion y floracion en paltos rebajados de uno y dos años, se ensayaron los tratamientos de anillado de 2 mm, doble incision anular (Verano y Otono) y Cultar (paclobutrazol), (Primavera) para aumentar floracion y cuaja. Se pudo determinar que todos los tratamientos lograron aumentar la intensidad de floracion, sin embargo los unicos tratamientos que lograron un cierto exito en aumentar la cuaja fueron los anillados de marzo y abril, ademas de la doble insicion de abril. Se determino que solo aumentan el rendimiento los tratamientos de anillado y doble incision en otono ademas del Cultar asperjado en primavera en dosis de 0,15 gr.i.a./l., obteniendose producciones similares con estos tres tratamientos, las cuales van acompañadas de un baja en calibre de la fruta. En arboles de dos años, el unico tratamiento que aumento produccion fue el Cultar, inyectado en primavera, en dosis 0,25 cc/m² de silueta.